

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA  
**STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES**  
DU  
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MONTPELLIER - 16, Rue de la République. TEL. M2 58-72

2ème année

15 AVR 1954

13 Avril 1954

**AVERTISSEMENT**

**TAVELURE DU POIRIER**

Toutes zones

Le développement des jeunes fruits et des feuilles (surfaces multipliées par 3 en moins d'une semaine) rend nécessaire l'exécution d'un traitement avec des sulfures micronisés, ou du captane, ou du zinèbe. Terminer ce traitement le 23 avril au plus tard.

**INFORMATIONS**

**CHEIMATOBIES**

Les chenilles arpeuteuses sont signalées sur cerisier et abricotier. Traiter méthodiquement avec D.D.T. ou parathion sur cerisier et abricotier, ou avec l'arséniate de plomb sur abricotier seulement.

**ANARSIA**

Cette tordeuse fait des dégâts importants en pépinières. Traiter avec le parathion ou le S.P.C.

**CRIOCERE de l'ASPERGE**

Faire, si c'est nécessaire, un traitement en pulvérisation ou en poudrage, avec un insecticide à base de D.D.T.

**AVIS IMPORTANT**

Il n'est tenu aucun compte des demandes de changement d'adresse non accompagnées de la somme de 30 frs en timbres-poste.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,  
P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,  
L.L. TROUILLON

Autorisation du 23 Janvier 1953 - Reproduction ou adaptation réservées  
Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc Roussillon - 16 rue de la République - Montpellier - Le Gérant : R. BERTRAND



Ministère de l'Agriculture  
-----  
Ecole Nationale d'Agriculture de  
MONTPELLIER

-----  
STATION REGIONALE  
d'AVERTISSEMENTS VITICOLES  
-----

Montpellier, le 12 Avril 1954

MILDIOU.

NOTE N° 2.

Une nouvelle et abondante germination des spores d'hiver du mildiou a été constatée le 12 avril à l'Ecole d'Agriculture de Montpellier.

Les taches primaires consécutives à cette attaque pourront se montrer vers le 21 avril sur les très jeunes feuilles portées près de terre par les rejets situés au pied des souches établies dans les situations les plus chaudes.

On ne saurait donc trop recommander de supprimer d'ici là tous les organes verts voisins du sol et susceptibles d'être à l'heure actuelle déjà contaminés.

Nous remercions par avance les personnes dont la vigilance nous fera connaître l'apparition des premières taches.

Le Directeur de la Station Régionale  
d'Avertissements Viticoles,

G. BERNON